

VECAR®

CARVEDILOL

BETA-BLOQUEANTE

COMPRIMIDOS
VIA DE ADMINISTRACION: ORAL

FORMULA:

VECAR 6,25: Cada comprimido contiene:

Carvedilol.....	6,25 mg
Excipientes.....	c.s.

VECAR 12,5: Cada comprimido contiene:

Carvedilol.....	12,5 mg
Excipientes.....	c.s.

VECAR 25: Cada comprimido ranurado contiene:

Carvedilol.....	25 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCION TERAPEUTICA:

VECAR es un beta-bloqueante no cardioselectivo con efecto vasodilatador periférico que reduce la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.

INDICACIONES:

Insuficiencia cardíaca congestiva de leve a severa de etiología isquémica o miocardiopática. Disfunción ventricular tras infarto de miocardio. Hipertensión arterial esencial.

CONTRAINDICACIONES:

Insuficiencia cardíaca descompensada con edema.
Enfermedad pulmonar obstructiva. Bloqueo aurículo - ventricular de 2° - 3° grado.
Bradicardia extrema. Insuficiencia hepática grave.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Infarto de miocardio reciente. Diabetes no controlada. Pacientes ancianos. Pacientes que se someterán a anestesia. Enfermedad vascular periférica. Embarazo. Lactancia.

Psoriasis. Feocromocitoma.

Administración simultánea de IMAO.

Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia a la lactosa del APP insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia o mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS COLATERALES:

Bradycardia, hipotensión ortostática, edema. Náuseas, dolor abdominal, diarrea. Vértigos, cefalea, somnolencia al inicio del tratamiento. Rara vez angina de pecho y trastornos de la potencia sexual. Aumento de las transaminasas séricas. Trombopenia y leucopenia.

INTERACCIONES:

Puede potenciar los efectos de otros antihipertensivos, insulina y otros hipoglucemiantes. La rifamicina disminuye su acción. Su acción es aumentada por calcioantagonistas, barbitúricos, fenotiazinas y antidepresivos tricíclicos.

POSOLOGIA:

Por vía oral, la dosis se inicia con 6,25 mg cada 12 horas y se aumenta según tolerancia cada 2 semanas hasta un máximo de 50 mg cada 12 horas.

RECOMENDACION:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas - Av. Gral Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204 800

PRESENTACION:

VECAR 6,25: Caja x 30 comprimidos

VECAR 12,5: Caja x 30 comprimidos

VECAR 25: Caja x 30 comprimidos

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

Venta Bajo Receta

Elaborado por

Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. - Acceso Norte.

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos.

Asunción - Paraguay

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719

SCAVONE HNOS. S.A.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España.

Director Técnico: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.